



Cu gumă de
caruba (roșcovă)



Farmalac[®]

Supliment de hrană pentru lactație



Indicat în diareea neonatală

- ✓ Corectează deshidratarea
- ✓ Îmbunătățește viabilitatea vițelilor cu afecțiuni gastrointestinale mecanice

Formulă echilibrată

- ✓ Cu lapte și suplimente nutritive
- ✓ Conține gumă de caruba (roșcovă), un anti-diareic de origine naturală
- ✓ Conține extract de *Saccharomyces cerevisiae*
- ✓ Palatabilitate ridicată

Rezultate excelente

- ✓ Foarte eficient în creșterea junincilor de înlocuire

LABIANA
always works

Farmalac[®] Supliment de hrană pentru lactație



Dubla acțiunea a Farmalac

Guma de caruba (roșcovă):

Acționează ca protecție mecanică a vilozităților intestinale, împiedicând aderarea bacteriilor patogene la acestea.


Bacterii patogene



Extract de *Saccharomyces cerevisiae*:

Acționează ca un prebiotic, stimulând dezvoltarea florei intestinale care concurează, în privința afinității pentru enterocite, cu bacteriile patogene.

Bacterii patogene



COMPOZIȚIE

Dextroză, lapte degresat și zer, pectină, bicarbonat de sodiu, extract din peretele celular al *Saccharomyces cerevisiae*, clorură de magneziu, clorură de potasiu și clorură de calciu.

Aditivi per kg:

Conservanți:

Diacetat de sodiu (E 262)..... 6 g

Agenti emulgatori:

Guma de caruba (roșcovă)(E-410) 50 g

Vitamine, provitamine și substanțe chimice bine definite cu efect similar:

Vitamina A/ palmitat de retinol (3a672b) 1.100.000 UI

Vitamina D3 (E671) 210.000 UI

Vitamina C / acid ascorbic (3a300)..... 1,15 g

Vitamina B12 / cianocobalamină 525 mg

D-pantotenat de calciu (3a841)..... 113,1 mg

Vitamina B2 / riboflavină 104 mg

Vitamina E / DL -α-tocoferol acetat (3a700)..... 101 mg

Niacinamidă (3a315) 100,5 mg

Vitamina B1 / mononitrat de tiamină (3a821) 60 mg

Vitamina K3 / bisulfid sodic de menadionă (3a710)..... 58 mg

Vitamina B6 / clorhidrat de piridoxină (3a831)..... 37,5mg

INDICAȚII

Înlocuitor de lapte în caz de diaree și/sau deshidratare.

POSOLOGIE ȘI CALEA DE ADMINISTRARE

Oral, în apă potabilă sau lapte.

Se dizolvă în apă potabilă sau în lapte degresat, la 37° C.

Vitei: 50-100 g/1,5 litri de lapte sau apă, de două ori pe zi, timp de 3-5 zile.

Miei și iezi: 20 g/300 ml lapte sau apă, de două ori pe zi, timp de 3-5 zile.

Poate fi utilizat la animale în vârstă de până la 16 săptămâni.

PRECAUȚII ȘI REACȚII ADVERSE

Nu se administrează împreună cu „antibiotice”, „factori de creștere” și „coccidiostatice”.

Aportul accidental a unor cantități mari de produs sub formă concentrată poate provoca tulburări gastrice și nervoase.

Urmați instrucțiunile medicului veterinar.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU PĂSTRARE

A se păstra într-un loc rece și uscat, sub 25° C, ferit de lumină.

MOD DE PREZENTARE

Plic de 100 g.

Sac de 1 kg.

⟨ESP-08100341

