

Labimycin[®] LA

Oxitetraciclină 300 mg/ml



Acțiune lungă și durabilă



**Indicat pentru
bovine și ovine.**

**Acum și pentru
porcină!**



Labimycin[®] LA

Acțiune mai lungă¹

pentru un antibiotic care evoluează în timp²

LABIANA
always works



Antibiotic de categoria D cu spectru larg, cu acțiune prelungită, cu o singură aplicare

Histophilus somni - *Mannheimia haemolytica* - *Pasteurella multocida* - *Mycoplasma bovis*
Arcanobacterium pyogenes - *Dichelobacter nodosus* - *Fusobacterium necrophorum*
Prevotella melaninogenica - *Chlamydophila* spp. - *Dermatophilus congolensis* - *Bordetella bronchiseptica*
Pasteurella spp. - *Staphylococcus aureus* - *Streptococcus agalactiae* - *Escherichia coli* - *Chlamydia abortus*
Chlamydia psittaci - *Mycoplasma* spp. - *Erysipelothrix rhusiopathiae*

FIECARE ML CONȚINE

Oxitetracilină (sub formă de dihidrat)..... 300 mg

INDICAȚII

Acest produs medicinal veterinar este indicat pentru controlul și tratamentul unei game largi de infecții comune sistemice, respiratorii, urinare și locale:

Bovine:

Tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de tulpini de *Histophilus somni*, *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* și *Mycoplasma bovis*.

Tratamentul metritei cauzate de tulpini de *Arcanobacterium pyogenes*.

Tratamentul infecțiilor ombilicale/articulare cauzate de tulpini de *Dichelobacter nodosus*, *Fusobacterium necrophorum* și *Prevotella melaninogenica*.

Ovine:

Tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de tulpini de *Mannheimia haemolytica* și *Pasteurella*.

Tratamentul infecțiilor genitale cauzate de tulpini de *Arcanobacterium pyogenes*, *Chlamydophila* spp. și *Dermatophilus congolensis*.

Tratamentul infecțiilor ombilicale/articulare cauzate de *Dichelobacter nodosus*, *Fusobacterium necrophorum* și *Prevotella melaninogenica*.

Porcine:

Tratamentul infecțiilor respiratorii cauzate de tulpini de *Bordetella bronchiseptica* și *Pasteurella*.

Tratamentul erizipelului cauzat de tulpini de *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

Tratamentul rinitei atrofile cauzate de tulpini de *Bordetella bronchiseptica* și *Pasteurella multocida*.

Alte infecții:

Tratamentul of mastitei cauzate de tulpini de *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae* și *Escherichia coli*.

Tratamentul avortului enzootic cauzat de tulpini de *Chlamydia abortus* și *Chlamydia psittaci*.

Tratamentul infecțiilor genitale și a poliartritei cauzate de tulpini de *Chlamydia abortus* și *Mycoplasma* spp.

POSOLOGIE ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Uz intramuscular.

Posologia generală recomandată, pentru o durată de activitate prelungită de 5 până la 6 zile, este o singură injecție intramusculară profundă de 30 mg oxitetracilină/kg greutate corporală (echivalent cu 1ml de produs medicinal veterinar/10 kg greutate corporală).

Doza maximă recomandată per loc de injectare:

Bovine: 15 ml

Ovine: 5 ml

Porcine: 10 ml

Purcei de 1 zi: 0,2 ml

Purcei de 7 zile: 0,3 ml

Purcei de 14 zile: 0,4 ml

Purcei de 21 zile: 0,5 ml

Purcei peste 21 de zile: 1 ml/10 kg

PERIOADE DE AȘTEPTARE

Bovine: Carne și subproduse: 35 zile. **Lapte:** 7 zile.

Ovine: Carne și subproduse: 35 zile. **Lapte:** 9 zile.

Porcine: Carne și subproduse: 28 zile.

CONTRAINDICAȚII

A nu se utiliza în cazuri de hipersensibilitate la substanța (substanțele) activă(e) sau la oricare dintre excipienți.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU UTILIZARE

A nu se dilua acest produs medicinal veterinar.

Dacă este administrat concomitent cu alte tratamente, se va utiliza un loc de injectare separat.

Înainte de tratarea oricărui proces infecțios, se recomandă confirmarea bacteriologică a diagnosticului și un test de sensibilitate a bacteriilor care provoacă procesul.

Utilizarea produsului trebuie să se bazeze pe identificarea și testarea sensibilității agentului/agenților patogen(i) țintă. Dacă acest lucru nu este posibil, terapia trebuie să se bazeze pe informații epidemiologice și pe cunoștințe despre susceptibilitatea agenților patogeni țintă la nivel de fermă sau la nivel local/regional.

Utilizarea produsului trebuie să fie în conformitate cu politicile antimicrobiene oficiale, naționale și regionale.

MOD DE PREZENTARE

Flacon de sticlă de culoarea chihlimbarului.

Flacoane de 100 ml și 250 ml.

Registru n° 4074 ESP.

Medicamentul face obiectul unei prescripții veterinare

Administrare sub controlul sau supravegherea medicului veterinar.

Referințe bibliografice:

• ¹ Labimycin[®] 300 mg/ml SPC.

• ² Vicente D, Pérez-Trallero E. Tetraciclina, sulfamidas y metronidazol [Tetracyclines, sulfonamides, and metronidazole]. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2010 Feb;28(2):122-30. Spanish. doi: 10.1016/j.eimc.2009.10.002. PMID: 20097452.