



+

**MAI MULT
Ketoprofen**

15%

-

**Perioadă de
așteptare
MAI SCURTĂ**

Labiprofen[®]
150 mg/ml



Administrare sub controlul sau supravegherea medicului veterinar.










LABIANA
always works



Labiprofen[®] 150 mg/ml Soluție injectabilă



Beneficiile unui antiinflamator nesteroidian cu o concentrație mai mare de ketoprofen

KETOPROFEN	15%			VS.	10%		
DOZARE	 1 ml/50 kg gr. corporală/zi	 1 ml/50 kg gr. corporală/zi	 0,75 ml/50 kg gr. corporală/zi		 1 ml/33 kg gr. corporală/zi	 1 ml/33 kg gr. corporală/zi	 1 ml/45 kg gr. corporală/zi
PERIOADA DE AȘTEPTARE	 2 zile Carne și organe Lapte	 3 zile -	 1 zi Neautorizat		 4 zile 0 ore	 4 zile -	 4 zile Neautorizat

COMPOZIȚIE PER ML

Ketoprofen.....	150 mg
Alcool benzilic.....	10 mg

INDICAȚII

Bovine:

- Reducerea inflamației și durerii asociate perioadei postpartum, tulburărilor musculoscheletice și claudicației.
- Reducerea febrei asociată bolilor respiratorii bovine, în combinație cu terapia antimicrobiană, după caz.
- Reducerea inflamației, febrei și durerii în mastita clinică acută, în combinație cu terapia antimicrobiană, după caz.

Porcine:

- Reducerea febrei în cazuri de boală respiratorie și a sindromului disgalaxiei postpartum - SDP (sindromul metrită-mastită-agalaxie) la scroafe, în combinație cu terapia antimicrobiană, după caz.

Cabaline:

- Reducerea inflamației și a durerii asociate cu tulburări osteoarticulare și musculoscheletice (claudicație, laminită, osteoartrită, sinovită, tendinită, etc).
- Reducerea inflamației și a durerii postoperatorii.
- Reducerea durerii viscerale asociată colicilor.

DOZARE ȘI CALE DE ADMINISTRARE

- Bovine: 1 ml ketoprofen pe 50 kg greutate corporală/zi pentru 1-3 zile, administrat i.v. sau i.m., de preferat în regiunea gâtului.
- Porcine: 1 ml ketoprofen pe 50 kg greutate corporală/zi, administrat i.m., o singură dată.
Tratamentul poate fi repetat la un interval de 24 de ore, pentru maxim trei tratamente.
Fiecare injecție trebuie administrată într-un alt loc.
- Cabaline: 0,75 ml de produs pe 50 kg greutate corporală/zi, administrat i.v., pentru 1-5 zile. În cazul colicilor, în mod normal o singură injecție este suficientă.

PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne:

- Bovine: 2 zile
- Porcine: 3 zile
- Cabaline: 1 zi
- Lapte:
- Bovine: zero ore.

PRECAUȚII ȘI REACȚII ADVERSE

A nu se utiliza la animalele predispuse la ulcerații sau sângerări gastrointestinale, pentru a nu agrava starea acestora.

A nu se utiliza la animale care suferă de boli cardiace, hepatice sau renale.

A nu se utiliza în cazuri de hipersensibilitate cunoscute la ketoprofen sau acid acetilsalicilic, sau la oricare dintre excipienți.

A nu se utiliza la animale cu antecedente de discrazie sau coagulopatie sanguină.

A nu se administra alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) concomitent sau în decurs de 24 de ore unul față de celălalt.

PRECAUȚII SPECIALE LA ADMINISTRARE

A nu se depăși doza recomandată. A nu se depăși perioada de tratament recomandată.

Utilizarea ketoprofenului nu este recomandată la mânji cu vârsta mai mică de o lună.

Când se administrează animalelor cu vârsta mai mică de 6 săptămâni, la ponei sau la animale în vârstă, este necesar să se ajusteze cu precizie doza și să se efectueze o urmărire clinică atentă.

A se evita injecția intraarterială.

A se evita utilizarea la animalele deshidratate, hipovolemice sau hipotensive, deoarece există un risc potențial crescut de toxicitate renală.

Utilizarea ketoprofenului nu este recomandată la porcii afectați de SMPGP (sindromul multisistemic al pierderilor în greutate post-întărcare), pentru a nu agrava starea acestora.

La cai, a se evita administrarea extravasculară.

UTILIZAREA ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE, LACTAȚIE SAU ÎN PERIOADA DE OUAT

Poate fi utilizat la vacile gestante și în lactație și la scroafele în lactație.

Nu se recomandă utilizarea la iepelile în lactație.

PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra flaconul în cutia de carton pentru a fi protejat de lumină.

PREZENTARE

Flacoane de 50, 100 și 250 ml

Nr. de înregistrare 3966 ESP

Medicament eliberat pe bază de rețetă veterinară

Administrare sub controlul sau supravegherea medicului veterinar.

