

Acțiune rapidă



Rumilab®

Supliment alimentar dietetic de uz veterinar



Indicat pentru indigestie

- ✓ Reduce riscul de acidoză
- ✓ Reduce riscul de cetoză
- ✓ Indicat în caz de atonie ruminală
- ✓ Tratament împotriva anorexiei

Acțiune rapidă

- ✓ Concentrație mare/cantitate
- ✓ Sursa alternativă de vitamine din grupul B și minerale
- ✓ Oferă materie primă pentru menținerea unei flore ruminale adecvate

Facilitatea utilizării

- ✓ Pachet cu două pliculețe
- ✓ Un tratament pentru fiecare animal
- ✓ Eficacitate maximă în tratamentele combinate cu Rumintral


LABIANA
always works



Dezvoltarea tabloului clinic al acidozei la rumegătoare

Carbhidrați fermentabili

Rumilab[®] oferă toate materiile prime necesare pentru dezvoltarea unei flore ruminale optime (protozoare, microorganisme celulolitice și microorganisme consumatoare de lactat).
Componentele din formula Rumilab[®] optimizează activitatea fermentativă a florei ruminale; astfel, **se poate obține randamentul maxim din dietă**, chiar și în situații adverse.
În plus, complexul de vitamine prezent în compoziția sa **stimulează apetitul**, care este esențial la animalele cu randament ridicat.



COMPOZIȚIE

Glicerol (4,64 g/kg), drojdie de bere (uscată), pulbere de cazeină, fosfat dicalcic, clorură de sodiu.

Aditivi (per pliculeț de 75g)

Vitamine, provitamine și substanțe chimice bine definite cu efect similar:

Vitamina B2/ riboflavină.....	50 mg
Niacinamidă (3a315).....	25 mg
Vitamina B1/dorhidrat de tiamină (3a820).....	15 mg

Aminoacizi, sărurile lor și altele substanțe similare:

DL-Metionină, pură din punct de vedere tehnic (3c301).....	3 g
--	-----

Elemente urmă sau compuși ai elementelor urmă:

Mangan (E5) (oxid de mangan).....	200,26 g
Zinc (E6) (sulfat de zinc heptahidratat).....	2,27 g
Fier (E1) (carbonat feros).....	1,04 g

Conservanți:

Propionate de sodiu (E281).....	45 g
Propionate de calciu (E282).....	30 g

INDICAȚII

Vaci de lapte și viței

- Reducerea riscului de acidoză, perioada recomandată de utilizare: maxim 2 luni.
- Indicat în special pentru vacile de lapte, cu un randament ridicat și pentru viței aflați la îngrășare intensivă.
- Reducerea riscului de cetoză la vacile de lapte.
- De asemenea, reprezintă o sursă alternativă de vitamine din grupul B și minerale.

POSOLOGIE ȘI CALE DE ADMINISTRARE

Reducerea riscului de cetoză:

Vaci de lapte:

1 pliculeț (175 g), de 1 sau 2 ori pe zi sau 1/2 de pliculeț (87,5 g)/zi, timp de 2-3 zile.

Reducerea riscului de acidoză:

Vaci de lapte: 1 pliculeț (175 g), de 1 sau 2 ori pe zi, sau 1/2 de pliculeț (87,5 g)/zi, timp de 2-3 zile.

Viței: 1/2 de pliculeț (87,5 g), de 1 sau 2 ori pe zi sau 1/4 de pliculeț (43,75 g)/zi, timp de 2-3 zile.

Se adaugă dozele indicate la 1 kg de hrană pentru un sac de amestec, în 1/2 kg de hrană la alte doze. Cale orală, în hrană.

Solicitați avizul unui medic veterinar înainte de utilizare sau înainte de a prelungi perioada de utilizare.

PERIOADĂ DE AȘTEPTARE

Nu este necesară.

UTILIZARE ÎN PERIOADA DE GESTAȚIE

Vaci de lapte: 3 - 6 săptămâni după fătare.

MOD DE PREZENTARE

Cutie cu 2 pliculețe de 175 g fiecare.

(ESP-08100341)